



Vemurafenib (Zelboraf®)

Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » hoch-dosiert

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Andreas Hochhaus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose.....	2
---	----------

Vemurafenib (Zelboraf®)

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Haarzell-Leukämie (HZL) » rezidiert/refraktär » hoch-dosiert

Stand: Oktober 2022

1 Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose

Vemurafenib, relapsed/refractory, high dose

onkopedia				Appraisal																		
Facts																						
Parameter	Results ¹⁵	HR ¹⁶	p value																			
RR ²	98			Evidence (LoE)																		
RFS ¹⁰	19.3			5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a										
				Clinical benefit (ESMO MCBS)																		
				1	2	3	4	5														
				■ curative ■ non-curative																		
Patients	untreated																					
Trial	Combined analysis of 2 single-arm phase 2 trials																					
Randomisation	:																					
N¹	49																					
New Therapy	Vemurafenib 960 mg bid																					
Control																						
Publication	DOI:10.1056/NEJMoa1506583																					

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

¹⁰ RFS - Relapse-Free Survival

¹⁵ results for control, results for new therapy

¹⁶ hazard ratio for new therapy